

CONDILOMAS		ALTERACIÓN CERVICAL/ANAL	
Básicos			
VPH es el virus del papiloma. Hay más de 100 serotipos (hasta ahora)			
Puede causar verrugas (condilomas en genitales, verrugas víricas en manos y pies) o alteraciones en cérvix o ano			
MUY RARA vez ocasiona alteraciones en la boca de adultos (serotipo 16)			
		Puede derivar en cáncer de ano, vulva, vagina, cérvix, pene	
Cada serotipo tiene preferencia por un lugar (genitales, otra piel, cérvix/ano)			
MUY COMÚN, casi imposible que no te contagies alguna vez en tu vida			
Se transmite por contacto: piel con piel, mucosa con mucosa			
6 y 11 No causan cáncer		VPH de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66	
		Alteración cervical/anal --> Precáncer --> Cáncer	
		El virus tarda 15 a 20 años en llegar a ser cáncer.	
Probabilidad: + parejas sexuales = + oportunidades de contagio			
Imposible saber cuándo te infectaste			
Prevención			
		Única actividad que disminuye el riesgo de Cáncer Cervicouterino: Abstinencia	
Usar preservativo, el femenino cubre más superficie que el masculino			
Circuncisión			
No fumar			
No rasurarte (causas herida, puerta de entrada)			
Síntomas			
Verrugas planas o coliflor o manchas oscuras y rugosas		Asintomático o Sangrado al tener sexo	
condilomas acuminados, verrugas genitales, papilomas venéreos o verrugas venéreas			
Detección			
Revisión médica		Vagina: citologías regulares	
		Pene: no recomendado	
		Ano si VIH+: citologías	
		Citología + --> Colposcopia --> Legrado/biopsia	
Tratamiento			
Congelación (crioterapia) o quitarlo con cirugía, cremas		Alteración cérvix/ano: vigilancia --> cirugía pequeña	
NO fumar			
No hay portadores de toda la vida			
El 70 % de las infecciones desaparecen en 1 año y el 90 % en 2 años			
Vacuna			
Gardasil 4 (serotipos 6, 11, 16, 18)			
Gardasil 9 (serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)			
		Cervarix (serotipos 16 y 18)	
Orientación sexual de la vacuna: le gustan hombres y mujeres por igual.			
Sanidad pública: niñas de 11 a 14 años, dos dosis			
Privada: cualquier edad, 3 dosis en 6 meses.			
TODO en esta vida tiene efectos secundarios.			
Sexo?			
Si hay lesión... (de preferencia) NO		Con preservativo	
Si ya no hay lesión... con condón			
Puedes tener:			
Solo condilomas			
		Solo VPH+ en cérvix/ano	
		VPH+ y alteración cervical/anal	
Condilomas y VPH +			
Condilomas, VPH+ y alteración cervical/anal			